# vertissements

BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

**. 27** (80)22.19.38 **.** 



## MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

EDITION : GRANDES CULTURES

**B**ulletin n° 4 - 22 mars 1984

# COLZA

Abonnement annuel: 95 Frs

→ EVOLUTION LENTE DE LA VEGETATION DEPUIS LE 16/03 : C1 - C2

CHARANCONS DE LA TIGE

- . BIEN SURVEILLER LES CUVETTES JAUNES DE PIÉGEAGE
- CAPTURES IRRÉGULIÈRES INTENSIFICATIONS LOCALES DU VOL
- . INTERVENTIONS INSECTICIDES POSSIBLES A PARTIR DU 24/03.

#### CHARANÇONS DE LA TIGE :

IDENTIFICATION DES CHARANCONS - STRATEGIE DE LUTTE : Voir bulletin nº 3 du 16/03

#### SITUATION ACTUELLE :

- La végétation a peu évolué depuis le dernier bulletin : stade C2 (décollement du bourgeon terminal). début de la période sensible pour les parcelles les plus en avance et les moins nombreuses.
- Le vol qui a commencé le 13 mars se poursuit mais il est très irrégulier selon les départements et les postes :

YONNE :

Sénonais, Jovignien Puisaye : Peu à pas de captures

Auxerrois: des captures (Courson 39 - La Brosse 13 - Mailly-la-Ville 31)

Tonnerrois : depuis le 17/03, captures irrégulières selon les postes

(Chassignelles 24 - Dye 14 - Gland 3 - Civry 1)

COTE-D'OR : Chatillonnais - Secteur Is/Tille - Plaine Dijonnaise : captures irrégulières, faibles dans l'ensemble (Nesle 30 – Bouix 5 – Belan S/O 4 – Louesme 1 - Ch. Aisey 1 - Quemigny 14 - Sault-le-Duc 10 - Til Chatel 12 -

Pichanges 3 - Varanges 4).

Val de Saône - région Beaune : Captures plus importantes

(Seurre 56 - Chaugey 23 - Tichey O - Chevignerot 51 - Vignolles 47)

NIEVRE: des captures dans le Nord (Clamecy 30 - Donzy 16 - Chazeuil 18 - Narey 5)

captures faibles dans le Sud (Diennes Aubigny 4 – Urzy 4)

JURA: captures irrégulières (Chêne Bernard 3 - Malange 23 - Annoire 23 - Aumur 9)

HAUTE-SAONE : captures irrégulières (Autrey 23 - R. Raucourt 8 - Velclair 5 - Noidans le F. 24)

SAONE ET LOIRE : captures faibles localisées dans le Sud du département (Laize 25 - La Salle 3 -

Savigny S/G 11)

- La dissection des charançons de la tige du colza, capturés dans le cadre du réseau, montre que les femelles ne sont pas encore aptes à pondre.

#### PRECONISATIONS :

- SEUILS INTERVENTION ATTEINTS
- TRAITEMENTS A PARTIR DU 24/3
  (SI LA PARCELLE EST AU STADE C2)
- SEUILS INTERVENTION NON ATTEINTS
- MAINTENIR LA SURVEILLANCE JUSQU'A TIGE 20 CM

(CAPTURES DANS LES CUVETTES) (IDENTIFICATION DE L'ESPÉCE) (OBSERVATIONS PIQURES PONTE)

\*\*\*\*\*

### MISE EN ROUTE DES RÉPONDEURS

Informations sur l'évolution des cultures, des maladies, des ravageurs

	BEAUNE	(80)	24.64.21	Côte-d'Or - Jura
*	NEVERS	(86)	57.10.43	Nièvre
*	VESOUL	(84)	75.32.14	Haute-Saône
*	AUXERRE	(86)	46.51.51	Yonne
*	MACON	(85)	34.50.86)	
*	VERDUN S/DOUBS	(85)	91.87.36	Saône-et-Loire

<sup>\*</sup> Répondeurs dans les locaux des Chambres d'Agriculture